



Classi di intensità delle specie allergeniche di pollini

La categorizzazione in classi di esposizione si applica alla concentrazione media giornaliera di pollini

specie	debole	medio	forte	molto forte
Nocciola (Corylus)	1 - 10	11 - 69	70 - 249	≥ 250
Ontano (Alnus)	1 - 10	11 - 69	70 - 249	≥ 250
Frassino (Fraxinus)	1 - 10	11 - 99	100 - 349	≥ 350
Betulla (Betula)	1 - 10	11 - 69	70 - 299	≥ 300
Carpino bianco (Carpinus)	1 - 10	11 - 69	70 - 249	≥ 250
Platano (Platanus)	1 - 49	50 - 99	100 - 399	≥ 400
Quercia (Quercus)	1 - 49	50 - 129	130 - 399	≥ 400
Faggio (Fagus)	1 - 49	50 - 129	130 - 399	≥ 400
Castagno (Castanea)	1 - 99	100 - 199	200 - 699	≥ 700
Graminacee (Poaceae)	1 - 19	20 - 49	50 - 149	≥ 150
Acetosa (Rumex)	1 - 14	15 - 24	25 - 59	≥ 60
Piantaggine (Plantago)	1 - 14	15 - 24	25 - 59	≥ 60
Assenzio (Artemisia)	1 - 5	6 - 14	15 - 49	≥ 50
Ambrosia (Ambrosia)	1 - 5	6 - 10	11 - 39	≥ 40

Concentrazione media giornaliera di pollini [pollini/m³]